

使用前にこの説明書を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう保管すること。

販売名：メンソレータムフレディメディカルジェルn  
ジフェンヒドラミンの抗ヒスタミン作用でかゆみを抑えます。

第2類医薬品  
鎮痒消炎薬

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 次の部位には使用しないこと。目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 医師の治療を受けている人(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人(3) 湿潤やただれのひどい人(4) 妊婦又は妊娠していると思われる人 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- 効能・効果 かゆみ、かぶれ、皮フ炎、湿疹、ただれ、じんましん、あせも、虫さされ、しもやけ
- 用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3) 外用にのみ使用すること。

■ 成分・分量(100g中) リドカイン 2.0g、ジフェンヒドラミン 1.0g、グリチルリチン酸二カリウム 1.0g、トコフェロール酢酸エステル 0.5g、イソプロピルメチルフェノール 0.1g 添加物：ヒアルロン酸Na、*l*-メントール、*d,l*-カンフル、1,3-ブチレンジグリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシビニルポリマー、乳酸、エデト酸Na、バラベン、香料

■ 保管及び取扱上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かないところに保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

お問合せ先  
コミュニケーションコール  
**0120-280-610**  
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝祭日)  
(女性スタッフが対応いたします。)

ロート製薬株式会社  
大阪市生野区巽西1-8-1